

© photos : Christophe Bulliot




► Furetons de 7 semaines.



Fureton de 3 jours.

Les soins des furetons

La reproduction des furets ne doit pas être encouragée en raison du nombre croissant d'abandons, mais si vous voulez vous lancer dans cette aventure, une bonne connaissance des spécificités des furetons est nécessaire pour un bon début dans la vie.



Par le Docteur
Christophe Bulliot
Vétérinaire,
consultant Nac

La furette met au monde 1 à 18 furetons (en moyenne 8) de 6 à 12 grammes, aveugles, quasi dépourvus de poils, les oreilles fermées et donc totalement dépendants de leur mère. Elle les débarrasse de leur placenta, coupe le cordon avec les dents et se couche en rond autour d'eux pour les réchauffer. Si ce n'est pas le cas, ils risquent de mourir d'hypothermie. Séchez-les rapidement et replacez-les près de leur mère un peu plus tard en s'assurant qu'elle s'en occupe (sans les toucher avec les doigts pour ne pas les imprégner de votre odeur).

Le développement des furetons

Il est conseillé de laisser la furette et ses petits en cage pour qu'elle ne les déplace pas loin du nid (boîte contenant

un linge propre changé régulièrement). Les furetons passent le plus clair de leur temps à dormir, manger et crier quand ils ont faim. Leur croissance est très rapide (environ 100 grammes à l'âge de 3 semaines, 150 à 4 semaines, 250 à 5 semaines et 400 à 6 semaines). Les yeux et les oreilles commencent à s'ouvrir à l'âge de 28 jours. Les mictions et les défécations deviennent autonomes vers 5 semaines de vie (on utilise du papier journal pour éviter tout risque d'ingestion de litière). Les furetons commencent à consommer des aliments solides à 3 semaines (aliments haut de gamme furetons ou chatons éventuellement mouillés avec un peu d'eau tiède au départ pour en faciliter la mastication). Le sevrage se fait entre 6 et 8 semaines de vie.

Les furetons restent en groupe et dorment les uns contre les autres. Leur socialisation doit commencer dès l'âge de 1 mois par des manipulations régulières en leur interdisant de mordiller.

Les vaccinations et les vermifugations commencent vers l'âge de 7 à 8 semaines. Les principales maladies des furetons sont les infections respiratoires et les diarrhées au sevrage s'il est trop brutal, ou suite à une infection bactérienne. Elles doivent être traitées en urgence car elles sont potentiellement fatales.

Les soins des orphelins

Il arrive qu'une furette rejette ses petits, ne puisse les allaiter ou décède (stress, portée trop nombreuse, manque de lait, maladie, etc.). Beaucoup d'orphelins ne seront pas sauvés surtout s'ils ont moins de 10 jours. Ils doivent être placés avec leur nid au chaud et à l'abri des courants d'air, dans une cage à part. Une bonne température (environ 34° C dans les premiers jours de vie, puis moindre en fonction de la pilosité des petits) est maintenue grâce à un tapis chauffant avec thermostat placé sous une partie du nid.

Du lait artificiel pour chatons tiédi à 38° C est distribué toutes les une à deux heures durant les 15 premiers jours à l'aide d'un petit biberon ou d'une petite seringue (0,3 millilitre à 1 millilitre selon le gabarit des furetons). Les petits ne doivent pas être placés sur le dos durant l'allaitement pour diminuer les risques de fausses routes. Il faut stimuler après chaque repas leurs besoins en frottant légèrement la région de l'anus et de l'orifice génital avec un coton humidifié à l'eau tiède. Une pesée quotidienne permet de vérifier la régularité de la croissance.

Placer les petits

Pour que la transition vers un nouveau foyer se passe sans encombre, pensez à donner aux futurs propriétaires toutes les informations utiles (date de naissance, courbe de poids, dates de vermifugations et de vaccinations, etc.) et notamment la marque de l'aliment habituel pour éviter toute transition alimentaire brutale. ■